

¿CÓMO SABER CUÁNDO UN NIÑO CON ASMA DEBE PERMANECER EN CASA?

Este guía no reemplaza el consejo de un medico profesional pero solamente se puede utilizar como una referencia.

Si su niño tiene estos síntomas:

- Una nariz congestionada, pero ninguna sibilancia o tos persistente
- Poco silbido o tos que desaparece después de tomar un medicamento de acción rápida.
- Capaz de realizar sus actividades diarias normalmente
- Puede respirar normalmente sin ningún esfuerzo extra
- Flujo máximo se encuentra en la zona verde

SU NIÑO PUEDE ASISTIR A LA ESCUELA

Si su niño tiene estos síntomas:

- Infección respiratoria, tal como dolor de garganta, cuello hinchado, glándulas dolorosas.
- Fiebre sobre 100 F rectal, la cara caliente o enrojecida
- Sibilancia o tos que continúa y no mejora aun después de dar la medicina (5-10 minutos después de usar aerosoles) de acción rápida
- Dificultad al respirar
- Flujo máximo está debajo de 80 por ciento (zona amarilla) de lo personal y no está respondiendo al tratamiento
- No puede dormir debido a los síntomas y el flujo máximo es bajo

SU NIÑO DEBE PROBABLEMENTE PERMANECER EN CASA

AAFA-TX recomienda que los padres llenen la **TARJETA DE ACCIÓN DE CHILDCARE ASTHMA/ALLERGY** con su profesor del niño, enfermera de la escuela o abastecedor del cuidado del día al principio de cada período de la escuela. Es legal ahora en Texas que mientras cuente con el permiso por escrito del padre y el medico el niño lleve y administre el medicamento de asma en la escuela. Pida una tarjeta de acción o la forma de permiso al info@aafatexas.org

The Asthma & Allergy Foundation of America, Texas
Ft. Worth, TX

817-297-3132 * info@aafatexas.org * www.aafatexas.org

Translation courtesy of Rick Montoya, RRT, Thomason Hospital, El Paso